ملحق: جدول بأهم الأمراض الانتقالية والاجازات الإجبارية والإجراءات القانونية في المدارس:

الإجراءات القانونية	الإجازة الإجبارية	المرض
إعطاء لقاح ضد مرض شلل الأطفال لجميع طلاب المدرسة التي ظهرت فيها الإصابة ويعطى اللقاح بجرعتين وتعطى الجرعة الثانية بعد مرور شهر على اعطاء الجرعه الاولى مع وضع المدرسة تحت التحري الوبائي لمدة 21 يوما وتاخذ نماذج البراز اللازمة مع متابعة الحالة الصحية للمصاب	اربعة اسابيع اعتبارا من تاريخ ظهور الأعراض يعاد الفحص بعدها	شئل الأطفال
إحالة المصاب والمشتبه بهم الى مستشفى الحميات مع إجراء فحص البراز للطالب المصاب بالإسهال للتحري عن الهيضة وتتوقف هذه الإجراءات بعد 10 ايام من ظهور اخر حاله الاسهال هذا وبالاضافه الى الإشراف الدقيق على الطعام والشراب ومكافحة النباب	ثلاثة أيام بعد ظهور نتيجة اخر فحص سالب للبراز	الهيضة
تهوية الصفوف والتأكد من وجود ندبة لقاح البي سي جي للملامسين	أسبوعين ويفحص قشع المريض بعد اسبوع من اخذ العلاج واذا كان سلبيا يعاد الفحص بعد انتهاء الإجازة	التدرن الرئو ي
التقتيش الصباحي للطلاب وإحالة المشتبه بهم إلى مركز الرعايه الصحيه الاوليه وتهوية الصفوف وتطهير المرافق الصحية	عشرة ايام اعتبارا من ظهور الأعراض يعاد الفحص بعد انتهاء الإجازة قبل السماح للطالب في الدوام	الثكاف
اخذ نماذج براز الملامسين ويعامل حامل الجرثومة معاملة المريض والاعتتاء بمصادر مياه الشرب والمرافق الصحية ونظافتها ومكافحة الحشرات	أسبوعين ويعاد فحص البراز مرتين التأكد من خلوه من جرثومة المرض	التيفونيد
إعطاء اللقاح المناسب للذين اعمارهم 7 سنوات فما فوق مع المتابعة المستمرة لاكمال الطلبة الجدد اللقاحات المطلوبة في حالة عدم تلقيحها مسبقا	أسبو عين	الخناق
كما في مرض الخناق في ما يخص متابعة إكمال التلقيحات	أسبوع اعتبارا من ظهور الأعراض	الحصبة
تهوية الصفوف وفحص الملامسين وإعطاء اللقاح والنظافة العامة وتقليل الازدحام وإعطاء جرعة وقائية من دواء الريفادين الملامسين ولمدة خمسة أيام	أسبوع يعاد الفحص بعدها	التهاب السحايا
فحص الملامسين وتهوية الصفوف وتلقيح طالبات الصف السادس الابتدائي بلقاح الحصبة الألمانية وإحالات المعلمات الحوامل لفحص تواجد الأجسام المضادة في الدم	خمسة ايام اعتبارا من ظهور الأعراض	الحصبة الألمانية
التقتيش الصباحي والعناية بالإصحاح البيئي في الصفوف وارسال المشتبه بهم إلى مركز الرعاية الصحية الأولية لاتخاذ اللازم	خمسة عشر يوما من بداية المرض	الجدري
معرفة الأطفال المتسربين من اللقاح الثلاثي وتلقيحهم وفحص الملامسين وتهوية الصفوف	أسبو عين	السعال الديكي
التأكيد على نظافة المطاعم والحوانيت المدرسية وتعقيم وتطهير المرافق الصحية وأماكن شرب الماء وإجراء الفحوصات المخبرية والطبية للعاملين في التغذية والحوانيت	عشرة أيام يعاد الفحص بعد انتهاء الإجازة	التهاب الكبد الفايروسي نمط A